

Почему кошка перестаёт опираться на задние лапы

Если у кошки внезапно отнимаются задние лапы, важно сразу оценить ситуацию. Такой симптом может быть связан с травмой, сосудистой катастрофой, неврологической проблемой или сильной болью. Чем раньше животное осмотрит специалист, тем выше шанс сохранить подвижность и избежать тяжёлых последствий.

Слабость задних конечностей у кошки может развиваться за несколько часов или нарастать постепенно. Хозяину важно не пытаться ставить диагноз самостоятельно и не давать человеческие обезболивающие. Ниже — о возможных причинах, тревожных симптомах, безопасных действиях до осмотра и подходах к терапии.

Как это выглядит

Потеря опоры на задние конечности — это не самостоятельный диагноз, а признак целого ряда состояний. Питомец может подтягивать заднюю часть тела, заваливаться набок, не опираться на конечность или вообще не вставать. Порой затрагивается лишь одна конечность, иногда — обе задние лапы.

- Внезапная слабость и шаткость походки
- Подволакивание лап, походка на запястьях
- Крен тела в одну сторону
- Крик или агрессия при прикосновении
- Отсутствие самостоятельного мочеиспускания

Важно различать ситуации, когда отнялись задние [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) лапы и тяжело дышит. Такая комбинация бывает признаком болевого шока или сосудистой катастрофы, поэтому нельзя ждать. Когда причина в сосудах или сердце, помощь нужна в течение ближайших часов.

Возможные причины

Причин много, и подтвердить их может только врач. Ниже перечислены состояния, которые чаще всего рассматривают на приёме.

- Повреждение при падении, ударе или драке
- Сосудистая проблема, при которой нарушается кровоснабжение
- Неврологические нарушения спинного мозга или периферических нервов
- Выраженный болевой синдром
- Обменные и эндокринные расстройства
- Инфекция или воспаление

Иногда владельцы связывают слабость задних лап с возрастом. Действительно, у пожилых кошек бывают дегенеративные изменения, но резкая потеря опоры не является обычной нормой старости. Также учитывают породную предрасположенность, например у вислоухих кошек.

Первая помощь дома

До приезда специалиста задача хозяина — безопасность и покой. Не пытайтесь вправлять конечности, массировать позвоночник или ставить уколы. Не давайте обезболивающие, предназначенные для людей: это может скрыть симптомы и навредить.

- Поместите питомца на ровную плоскость
- Ограничьте Movement: уберите других животных и детей
- Не берите за передние лапы и не тяните за хвост
- Сохраняйте тепло и не кормите насильно
- Зафиксируйте, что и когда произошло

Для перевозки лучше использовать жёсткую переноску или коробку. При подозрении на травму позвоночника фиксируйте тело максимально ровно. Если есть задержка мочи, это отдельный повод торопиться.

Как врач ставит диагноз

На приёме сначала собирают анамнез и осматривают питомца. Специалист оценивает чувствительность, рефлексы, пульс, температуру и болевую реакцию. Дальше назначают исследования, чтобы понять причину.

- Рентгенография костей и суставов
- Ультразвуковое исследование органов и сосудов
- Лабораторные анализы крови и мочи
- ЭКГ при подозрении на сердечную причину
- Неврологический осмотр для оценки спинного мозга

Набор исследований зависит от состояния. Одни процедуры возможны на дому, другие — только в клинике. Не откладывайте диагностику, если лапы отнялись внезапно.

Принципы лечения

Лечение всегда направлено на причину. При травме может понадобиться операция и иммобилизация. При сосудистом нарушении важна экстренная помощь. При неврологических причинах используют препараты и восстановление.

Состояние	Подход	Цель	Травма	Стабилизация, обезболивание, операция при необходимости	Восстановить опору и снять боль
Сосудистое нарушение	Экстренная госпитализация и поддержка кровотока	Сохранить жизненно важные функции	Неврологическая причина	Медикаменты, физиотерапия, уход	Постепенно вернуть подвижность
Болевой синдром	Обезболивание по назначению	Дать комфорт и покой			

Дома важно строго соблюдать назначения. Не давайте дополнительные лекарства без согласования. Если состояние ухудшается, сообщите врачу.

Когда нужно срочно вызывать врача

Некоторые симптомы требуют немедленной помощи. Отказ задних лап сам по себе — серьёзный повод. Особенно если состояние развилось резко.

- Тяжёлое дыхание или посинение слизистых

- Судороги, потеря сознания
- Неостанавливающееся кровотечение
- Нет мочеиспускания
- Сильная боль и крик

Когда животное не встаёт и тяжело дышит, не ждите планового приёма. Чем раньше обратиться, тем выше шансы.

Уход и восстановление

Восстановление иногда длительное. Важны покой, мягкая подстилка и удобный доступ к воде. Если кошка не ходит, важен гигиенический уход.

- Не заставляйте вставать через силу
- Переносите на ровной поверхности
- Следите за состоянием кожи и шерсти
- Сразу звоните врачу при задержке мочи
- Выполняйте назначения и приходите на контроль

Не наносите согревающие средства на позвоночник. Не применяйте лекарства без назначения. Прогноз зависит от причины и скорости обращения.

Профилактика

Полностью исключить все причины нельзя. Но некоторые риски снижают базовые меры. Плановые осмотры помогают выявить проблему раньше.

- Держите окна и балконы безопасными
- Убирайте ядовитые вещества и растения
- Следите за весом и активностью
- При травме сразу обращайтесь к врачу
- Регулярно посещайте врача

При хронических болезнях, **Перейдите на этот сайт** следуйте плану лечения. Это снижает риск обострений.

Заключение

Потеря опоры на задние лапы — повод срочно оценить состояние. Причины могут быть разными: от травмы до сосудистой или неврологической проблемы. Не лечите самостоятельно и не откладывайте визит к специалисту.

Ранняя диагностика и лечение повышают шансы на восстановление. Соблюдайте рекомендации врача, обеспечьте покой и уход. При ухудшении сразу обращайтесь за помощью.

Часто задаваемые вопросы

Почему у кошки отнимаются задние лапы?

Возможны травма, сосудистая катастрофа, неврологическая патология, выраженная боль, обменные или инфекционные причины. Точную причину определяет врач после осмотра и исследований.

Что делать до приезда врача?

Обеспечьте покой и ровную поверхность. Не вправляйте конечности, не массируйте позвоночник, не давайте лекарства для людей. Соберите сведения о произошедшем и дождитесь врача.

Когда нужна срочная помощь?

Если есть тяжёлое дыхание, судороги, потеря сознания, кровотечение, отсутствие мочеиспускания или резкая боль. В этих случаях медлить нельзя.

Как ставят диагноз?

Осматривают, проверяют рефлексы и чувствительность. По показаниям назначают рентген, УЗИ, анализы, ЭКГ и неврологический осмотр. Часть процедур возможна на дому, часть — в клинике.

Можно ли давать обезболивающее?

Без назначения врача — нельзя. Человеческие препараты могут навредить и исказить картину. Обезболивание подбирает только специалист.

Вернётся ли подвижность?

Прогноз зависит от причины и скорости обращения. При ранней диагностике и лечении шансы выше. Дальнейшие рекомендации даёт лечащий врач.