

Микоплазмоз у кошек: симптомы, диагностика и как действовать

Микоплазмоз у кошек — это бактериальное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода *Mycoplasma*. Обычно они поражают дыхательные пути, слизистую глаз и органы мочевого выделения. Многие владельцы узнают о болезни случайно, когда у питомца появляется одышка, возникает слабость задних конечностей или моча окрашивается кровью.

Возбудитель может долго жить на слизистых оболочках без явных симптомов, а заболевание проявляется при снижении иммунитета. Важно понимать, что заключение ставит ветеринарный врач по результатам анализов, а самостоятельный подбор препаратов может навредить. При подозрении на *Mycoplasma* лучше пригласить специалиста.

Микоплазмоз у кошек: общее представление

Mycoplasma — это мельчайшие бактерии, у которых отсутствует жёсткой клеточной стенки. Их обнаруживают на слизистых дыхательных путей, глаз и мочеполовой системы не только у больных, так и у клинически здоровых питомцев. Патология возникает не у всех носителей, а когда складываются предпосылки: напряжение, холод, вирусные инфекции или прочие факторы, снижающие защитные силы организма.

Mycoplasma-инфекция не обязательно протекает как самостоятельная болезнь. Нередко он идёт вместе с кальцивирусной инфекцией, ринотрахеитом или другими дыхательными патологиями. По этой причине ветеринар учитывает не лишь наличие микоплазмы, но и общее состояние животного.

Симптомы микоплазмоза у кошек

Признаки заболевания зависят от того, какая система вовлечена. Когда затронуты дыхательные пути, кошка может дышать тяжело, хрипеть, чихать или кашлять. В случае поражении глаз появляются слёзные выделения, покраснение и слизистые выделения. Когда задеты органы мочевого выделения, владелец может заметить кровавые примеси в моче, частые позывы или болезненное мочеиспускание.

- Выделения из носа и затруднённое носовое дыхание
- Воспаление слизистой глаз, слезотечение
- Вялость, отказ от еды
- Повышение температуры — не всегда
- Гематурия, частые позывы
- Нарушение походки, слабость в задних конечностях

Особенно должны насторожить резкие перемены: кошка перестаёт есть, у животного начинается рвота или жидкий стул, возникает одышка. Когда у питомца отказывают задние лапы или он не может встать, такое состояние нуждается в неотложной помощи специалиста. Не стоит ждать — лучше обратиться в клинику.

Как диагностируют микоплазмоз

Диагностика заболевания включает ряда шагов. Первым делом специалист оценивает животное, собирает анамнез и жалобы владельца. После этого могут потребоваться анализы: ПЦР для выявления ДНК

возбудителя, цитология или бактериологический посев. Важно, что обнаружение микоплазмы не обязательно подтверждает, что именно этот возбудитель стала причиной патологии — результат трактуют вместе с клинической картиной.

МетодНа что направленПЦРПрисутствие генетического материала возбудителяЦитологияКлеточный составБактериологический посевВозможность подбора чувствительности к антибиотикамОбщий анализ кровиВоспалительные измененияБиохимия кровиРабота внутренних органов

Только специалист способен корректно интерпретировать данные и подобрать лечение. Не стоит самостоятельно назначать антибиотики — такой подход способен изменить результаты и навредить животному.

Как лечат микоплазмоз

Терапия микоплазмоза обязано быть комплексным и подбираться специалистом. Основу часто образуют антибактериальные препараты, к которым микоплазма чувствителен. Но не все антибиотики эффективны — некоторые могут не действовать из-за отсутствия клеточной стенки у микоплазмы. Именно поэтому подбор препарата должен осуществлять врач.

Дополнительно могут использоваться поддерживающие средства: инфузионная терапия при потере жидкости, жаропонижающие (с осторожностью), витаминные комплексы и иммуномодуляторы. Существенно создать питомцу спокойную обстановку, комфортное место и доступ к питью. Если кошка не хочет есть, иногда потребоваться насильное кормление или инфузия.

Ни в коем случае не давайте животному человеческие препараты самостоятельно. Некоторые из них могут быть ядовитыми для кошек — к примеру, ацетаминофен и ибупрофен вредны. Всегда уточняйте у специалиста, каким препаратом разрешено помочь питомцу.

Профилактика микоплазмоза и действия при подозрении

Профилактика заболевания состоит из сохранения защитных сил, полноценное кормление, своевременные осмотры к ветеринару и обработку от блох и клещей. Волнение, холод и общение с заражёнными кошками могут увеличивать риск появления патологии. Если дома живёт другой кот, его нужно продемонстрировать врачу и при необходимости сдать анализы.

1. Отделите кошку от прочих животных, если есть симптомы заболевания
2. Созвонитесь с ветеринарным специалистом и расскажите симптомы
3. Не давайте лекарства самостоятельно
4. Создайте животному покой и доступ к воде
5. Соблюдайте рекомендации врача и не заканчивайте лечение по своему усмотрению

Когда у кошки возникли опасные признаки — тяжёлое дыхание, судороги, кровавые выделения в моче, отказ поддержки задних конечностей — нужно незамедлительно связаться за ветеринарной помощью. Промедление может привести к серьёзным последствиям.

Особенности ухода за кошкой при микоплазмозе

Забота за питомцем с заболеванием требует обеспечение спокойных условий содержания. Питомцу необходим отдых, тёплое место и отсутствие стрессов. Если есть выделения из глаз или носа, их аккуратно

убирают ватным тампоном, смоченным чистой водой или физраствором. Также необходимо следить за аппетитом и питьевым режимом.

Если кошка не хочет есть дольше одного дня, такое состояние способно оказаться угрожающим. В таком случае нужно сказать ветеринару. Пища обязана быть лёгкой и питательной — разрешено применять особые рационы для ослабленных кошек или мягкую еду по назначению врача.

Заключение

Мycoplasma-инфекция у кошек — серьёзное заболевание, которое нуждается в внимательного отношения и своевременной диагностики. Не стоит практиковать самолечением или откладывать визит к ветеринару. Когда у кошки возникли опасные признаки, лучше [Продолжить чтение](#) как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.

Помните, что корректный уход, поддержка иммунитета и соблюдение рекомендаций врача помогают питомцу быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни. Мы всегда готовы оказать помощь — обращайтесь.

Часто задаваемые вопросы

Опасен ли микоплазмоз для человека?

Отдельные разновидности *Mycoplasma* способны оказаться опасны для людей, однако кошачьи штаммы, как правило, не передаются человеку. Тем не менее стоит соблюдать гигиену: мыть руки после контакта с питомцем, в частности если у кошки имеются выделения или слизистых.

Можно ли вылечить микоплазмоз у кошки полностью?

Окончательное удаление от микоплазмы не всегда возможно, так как многие кошки становятся носителями. Однако корректное лечение помогает устранить симптомы и улучшить качество жизни животного. Ключевое — своевременно обратиться к специалисту и выполнять назначения.

Как быстро проявляются симптомы микоплазмоза после заражения?

Скрытый период способен длиться от нескольких дней до недель. Признаки могут появиться постепенно или резко, особенно когда иммунитет снижен. Порой патология развивается без выраженных симптомов.

Существует ли вакцина от микоплазмоза?

Специфической прививки от микоплазмоза сегодня не существует. Профилактика сводится к поддержанию иммунитета, сбалансированному питанию, регулярным осмотрам у специалиста и снижению стрессовых факторов.

Передаётся ли микоплазмоз от кошки к собаке или другим животным?

Микоплазмы отличаются видоспецифичностью, то есть кошачьи штаммы, как обычно, не опасны для собак и других животных. Однако разные виды микоплазм способны поражать разных животных, поэтому при подозрении на инфекцию стоит изолировать питомца и проконсультироваться с ветеринаром.

Какие анализы назначают при подозрении на микоплазмоз?

Обычно ветеринар рекомендует ПЦР (полимеразную цепную реакцию) для обнаружения ДНК возбудителя, цитологическое исследование мазков и, при необходимости, бактериологический посев. Также могут потребоваться общий и биохимический анализы крови для оценки общего состояния питомца. Точный список определяет врач по клинической картине.